

Fact sheet

Fosfaatbinders




Reikwijdte: volwassenen en kinderen met chronische nierschade stadium G3 en G4
 Volwassen en kinderen met chronisch nierfalen stadium G5 en G5D




Dit schema geeft een overzicht van alle fosfaatbinders.
 Er wordt aangegeven op welke wijze de binders ingenomen moeten.
 Er wordt onderscheid gemaakt tussen calciumhoudende en calciumvrije fosfaatbinders.
 Van de calciumhoudende fosfaatbinders wordt eveneens de calciumbelasting vermeld.

Nota bene:

De veiligheid en werkzaamheid van Fosrenol[®], Velphoro[®] en Osvaren[®] bij kinderen en adolescenten zijn niet vastgesteld. Gebruik door patiënten < 18 jaar wordt door de fabrikanten dan ook niet aanbevolen. De nefroloog kan echter besluiten deze middelen 'off label' voor te schrijven.

Calciumhoudende fosfaatbinders:







Calciumcarbonaat		Tablet 500 mg 200 mg Calcium	Fijn kauwen Evt. verpulveren 15 minuten vóór het eten
Calciumcarbonaat		Tablet 500 mg 200 mg Calcium	Fijn kauwen Evt. verpulveren 15 minuten vóór het eten
Calciumcarbonaat		Capsule 500 mg 200 mg Calcium	Heel doorslikken 15 minuten vóór het eten


Calci-chew [®] 500		Tablet 1250 mg 500 mg Calcium	Fijn kauwen Evt. verpulveren 15 minuten vóór het eten ¹
Calci-chew [®] 1000		Tablet 2500 mg 1000 mg Calcium	Fijn kauwen Evt. verpulveren 15 minuten vóór het eten ¹
Osvaren [®]		Tablet 670 mg 110 mg Calcium	Geheel doorslikken Evt. verpulveren Tijdens het eten

¹ voorgeschreven als calciumsupplement bij hypocalciëmie of osteoporose: inname voor de nacht

Niet calciumhoudende fosfaatbinders:

Fosrenol [®]		Tablet 500 mg	Fijn kauwen Evt. verpulveren Tijdens het eten
Fosrenol [®]		Tablet 750 mg	Fijn kauwen Evt. verpulveren Tijdens het eten
Fosrenol [®]		Tablet 1000 mg	Fijn kauwen Evt. verpulveren Tijdens het eten

Fosrenol®		Poeder 750 mg	Toevoegen aan voeding Tijdens het eten
Fosrenol®		Poeder 1000 mg	Toevoegen aan voeding Tijdens het eten
Renagel®		Tablet 800 mg	Geheel doorslikken Tijdens het eten
Renvela®		Tablet 800 mg	Geheel doorslikken Tijdens het eten
Renvela®		Poeder 2400 mg	Oplossen in water Tijdens het eten
Sevelamer		Tablet 800 mg	Geheel doorslikken Tijdens het eten

Velphoro®		Tablet 500 mg	Fijn kauwen Tijdens het eten
-----------	---	------------------	---------------------------------

Zie ook DNN Achtergrond Richtlijn Mineraal- en botstoornis en DNN Fact Sheet Medicatie.